

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA  
"ALMACENE ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### GENERALIDADES:

Es una suspensión concentrada exento de nitratos y cloruros, diseñado para ser utilizado vía foliar. Su uso está recomendado para prevenir y corregir de forma eficiente y rápida los estados de déficit de Zinc, ocasionado por los cambios en los niveles de este elemento en el sustrato o defectos en el metabolismo del mismo. Los aditivos del **FOLIKELT ZN** facilitan que este tenga al momento de la aplicación, una cobertura uniforme y bien distribuida sobre la superficie de las hojas, a fin de garantizar la mayor eficiencia de este producto. Se recomienda aplicar **FOLIKELT ZN** a la brotación del cultivo y durante su desarrollo vegetativo, el Zinc es requerido para el crecimiento generativo y la viabilidad del polen es altamente dependiente de un adecuado suplemento de este nutriente. Además de participar como factor en la producción de auxinas, lo cual favorece el cuajado y llenado de los frutos.

#### VENTAJAS

- ➔ Activa el desarrollo radicular y el crecimiento de los brotes.
- ➔ Máximo crecimiento y desarrollo uniforme de los cultivos.
- ➔ Aumenta el porcentaje de cuajado y el calibre de los frutos.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola, con la excepción de productos de reacción alcalina. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de usarse.

#### CONSIDERACIÓN DE USO Y APLICACIÓN

- ➔ Agite bien el envase antes de usar.
- ➔ Colocar agua en el estanque hasta la mitad.
- ➔ Agregue la cantidad necesaria de **FOLIKELT ZINC**, previamente diluida en forma homogénea y luego completar con agua, manteniendo la agitación hasta el término de la aplicación.
- ➔ Prepare la solución de **FOLIKELT ZINC** el mismo día de la aplicación.
- ➔ No almacene **FOLIKELT ZINC** diluido en agua.

#### PRECAUCIONES

- ➔ Antes de usar este producto, leer las precauciones e instrucciones de uso.
- ➔ Manipularlo con un equipo de protección personal completo (overol, guantes, anteojos, etc.).
- ➔ Realizar la aplicación siguiendo la dirección al viento.
- ➔ No comer o beber durante la preparación de la mezcla.
- ➔ Mantener alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.
- ➔ Puede causar ligera irritación si el producto entra en contacto con la piel u ojos.
- ➔ Evitar el contacto e inhalación de la deriva durante la aplicación del producto.
- ➔ Si el producto es mezclado con pesticidas y/o adyuvantes, seguir todas las precauciones de la etiqueta del pesticida y/o adyuvante.
- ➔ Almacenar en un lugar fresco y con buena ventilación.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- ➔ En caso de ingestión, tomar grandes cantidades de agua e inducir al vómito. Recibir atención médica.
- ➔ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos por lo menos.
- ➔ Si la irritación persiste, pedir asistencia médica.
- ➔ En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Recibir atención médica.
- ➔ Si existiera contacto con una solución mezclada con un pesticida, seguir las recomendaciones del pesticida en uso.

The image shows a large, stylized label for FOLIKELT ZN. At the top, the brand name 'FOLIKELT' is written in large, bold, yellow letters with a green outline, and 'ZN' is written below it in large, bold, blue letters. To the right of the name is a small green leaf icon. Below the name, there is a blue banner with the text '% P/V' and '70.00%'. In the center, the word 'Zinc' is written in a large, bold, blue font. Below this, there are three bullet points in Spanish: '➔ Activa el desarrollo radicular y el crecimiento de los brotes.', '➔ Máximo crecimiento y desarrollo uniforme de los cultivos.', and '➔ Aumenta el porcentaje de cuajado y el calibre de los frutos.' At the bottom left, the 'Grovelab' logo is displayed, consisting of a green leaf icon and the word 'Grovelab' in a bold, sans-serif font. Below the logo, the text 'Formulado y Envasado por: Innovaciones y Formulaciones S.A.C. Av. Trapiche Mz. G Lt.16 Oficina 301 Comas, Lima - Perú Teléfono: 940520093 / (01) 5629116 ventas@grovelabperu.com' is written. At the bottom right, there is a yellow circle with the text '1LT CONTENIDO NETO'. At the very bottom, there is a yellow warning triangle with a black exclamation mark and the text 'MODERADAMENTE PELIGROSO. DANINO.'

#### RECOMENDACIONES DE USO:

| Cultivos                    | Dosis DOSIS (cc/ha)    | Observaciones   |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Papa                        | 150 - 300              | Aplicar a los 30 días de la emergencia. Repetir con intervalos de 14 días.  |
| Cebolla y Ajo               | 200 - 500              | Aplicar a los 30 días después del trasplante, repetir a los 15 días después de la primera aplicación.   |
| Espárrago                   | 300 - 500              | Aplicar a partir de la apertura de Filocladios hasta antes de la floración.   |
| Zanahoria                   | 200 - 400              | Hacer 1 a 2 aplicaciones post cuajado, distanciadas 7 días distanciadas entre ellas.  |
| Lechuga, Hortalizas de Hoja | 70 - 150               | Aplicar a partir de los 15 días después del trasplante, y repetir de ser necesario cada 7 días.   |
| Frijol, Vainita, Pallar     | 100 - 200              | Para el tratamiento de semillas.  |
| Alverja Holantao            | 150 - 300              | Aplicar 7 días después de la emergencia y en pleno desarrollo vegetativo y pre-floración.   |
| Arroz                       | 150 - 350<br>150 - 400 | Para el tratamiento de semillas. Aplicación foliar a los 30 días después del trasplante, durante el macollaje y en plena formación de espiga. |
| Maíz                        | 150 - 350<br>150 - 400 | Para el tratamiento de semillas. Aplicación foliar entre las etapas V3 y V6 (21 hasta 60 días después de la siembra).                         |
| Cítricos, Palto, Café       | 400 - 700              | Aplicar durante la etapa de pre floración y floración con intervalos de 15 días.  |
| Tomate, Pimiento, Ajíes     | 150 - 350              | Aplicar a partir de los 45 días después del trasplante, antes de la floración y repetir con intervalos de 14 días.                            |
| Arándanos y Fresa           | 100 - 200              | Aplicar al inicio de floración y repetir a los 14 días según la necesidad del cultivo.  |
| Uva de mesa y Vinífera      | 400 - 500              | Primera aplicación cuando el brote tenga una longitud de 40 a 60 cm. La segunda, en prefloración y la tercera en plena floración.             |
| Manzano, Melocotón          | 300 - 400              | Aplicar a la aparición de botones florales y repetir a los 15 días.   |

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Seguir las instrucciones de uso de la etiqueta, respetar las dosis recomendadas. No depositar cerca o en fuentes de agua. Haga triple lavado a los envases. Asegúrese de dar un manejo y tratamiento adecuado a los envases del producto entregando los envases vacíos en los centros de acopio autorizados.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- ➔ Guárdese bajo llave y lejos de alimentos, granos, semillas y forrajes.
- ➔ Manténgase en un lugar fresco, seco, y bien ventilado.
- ➔ En caso de derrames, recoger el producto.
- ➔ No se transporte junto con productos alimenticios, ropa, semillas, forrajes y fertilizantes.
- ➔ Asegure el producto durante su transporte.

"AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO"